



Overzicht bloemkool teeltseizoen 2025

Een jaar waar alles volgens planning kon uitgeplant worden, maar droogte opnieuw een hot item was



Inhoudstafel

- TACO
- Eerste vrucht
 - Weersomstandigheden
 - Koolvlieg
 - Insectendruk
 - Teeltomstandigheden
 - Oogst
- Tweede vrucht
 - Weersomstandigheden
 - Insectendruk
 - Knolvoet op de stam
 - Teeltomstandigheden
 - Oogst en oogstspreading

TACO



Nieuwe aanwinsten


- **Victor Snaet**
 - Begonnen in april 2025
 - Full time
 - Specialisatie Bloemkool en Prei
- **Wim Vandoolaeghe**
 - Begonnen eind juni
 - Deeltijds
 - Specialisatie Spruitkool
 - Helpt Rudi

Eerste vrucht


Koolvlieg alom

Weers voorja

bron KMI, Inagro



Aantal koolvliegen per provincie



Koolvlieg



icht land
bomen
n
ng was



Insectendruk

- Groene perzikluis laag
- Melige koolluis laag, tegen einde teelt (juli) hoog
- Koolwitte vlieg (voor verse markt) laag
- Rupsen laag
- Vroeg veel aardvlooien gezien, ook onder klimaatdoek
 - Verimark/Okina als plantbakbehandeling
 - OF Gazelle/Insyst vollevelds

Teelton



legend
oeter 's
S,
eeldauw

maar in



Teeltomstandigheden

- Bladvolume bleef soms/regelmatig beperkt
 - Kolen moesten gedekt worden



Oogst


- Vroeg gestart, vanaf 20 juni
- Meeste geoogst tussen 1 en 10 juli
- Zeer goede opbrengsten
- Toch ook nog oogst tweede helft juli, met beperkt aantal draaidagen

Tweede vrucht

Zeer droge zomer

Weers zome

bron KMI, Inagro





Insectendruk

- Melige koolluis druk steeg doorheen het seizoen
- Groene perzikluis laag
- koolwitte vlieg perceels- en regioafhankelijk
- Rupsen goed op te passen
- Aardvlooiën talrijk aanwezig in zware grond eerste weken na planten
- Meer luisbestrijding nodig

Knolvoet op de
stam



ortels
bij de



Teeltomstandigheden

- Alle mogelijkheden die konden genomen worden, werden ingezet
 - Soms te vroeg water gegeven, weinig nut voor grote warmte
- Captatieverbod breide uit waardoor ook in de polder verboden was



Teeltomstandigheden

- Bijbemesten in kolen was ook moeilijk
 - Stonden stil door de droogte
 - N-analyses gaven soms nog hoge waarden weer (vooral in augustus/september) door contaminatie van eerste laag



Oogst en oogstspreading

- Vanaf eind september tot half november, meestal op tijd
- Goede opbrengst
- Minder tipburn gezien
- Opletten voor te veel gruis door instelling oogstmachine
 - Dieper uitboren
 - Niet te veel breken

Jonas Bodyn

Rudi Vandewiele

Victor Snaet

Wim Vandoolaeghe

Luc De Reycke

